

FICHA TÉCNICA **BRUMOLINE – CEBO RATICIDA EN GRANOS**

1)-NOMBRE Y MARCA DEL PRODUCTO

Nombre del producto: Brumoline- Cebo Raticida en granos.

Marca: Brumoline

2)-FORMAS DE PRESENTACIÓN

-Estuche de cartulina conteniendo 100g, 200g o 500g de producto en bolsa de polietileno de alta densidad y bandeja para colocar el raticida, de poliestireno de alto impacto.

-Bolsa conteniendo 5 Kg.

-Bolsa conteniendo 25 Kg.

3)- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAGUICIDA

Características

-Formulación: Cebo granulado de color rojo

-Principio activo: Warfarina (fenil-acetil-etil-hidroxicumarina)

-Grupo Químico: anticoagulante coumarínico.

-Modo de acción: acción anticoagulante por deplección de la síntesis de los factores de la coagulación vitamina K dependientes. Mata por hemorragias internas.

Atrae- Mata y Deseca

Atrae: El deseo de las ratas y los ratones por comer este cebo es tan fuerte que salen de sus escondrijos y lo prefieren a cualquier alimento, retornando a comerlo de nuevo, aún moribundos.

Mata: Provoca una muerte lenta por hemorragias internas, sin prevenir al resto de la colonia..

Deseca. Impide la descomposición de los animales muertos, evitando la propagación de peligrosas enfermedades y olores desagradables.

- Contiene Bitrex, sustancia de sabor amargo, repelente frente a un accidental consumo de animales o personas.

-Escala de toxicidad: categoría III

-Plaga Blanco: rata gris, noruega o de las cloacas (*Rattus norvegicus*), Rata negra o domestica (*Rattus rattus*), Rata alejandrina o de los tejidos (*Rattus rattus alejandrinus*) y Ratón doméstico(*Mus musculus*) -

Modo de empleo

En ambientes cerrados como casas, galpones o similares:

- 1) Cierre comunicaciones al exterior mayores a 1 cm.
- 2) En caso de no poder ser así, aplique el modo de uso para ambientes abiertos.
- 3) Vierta Brumoline en los comederos incluidos o en cualquier otro recipiente plano, colóquelo en todos aquellos sitios que delaten huellas de roedores.
- 4) Si al siguiente día queda algún recipiente vacío duplique la cantidad de Brumoline (hay ratas que no han comido). Caso contrario reponer el consumo.
- 5) Continúe reponiendo Brumoline diariamente hasta que desaparezca todo signo de actividad de los roedores.

En ambientes abiertos:

- 1) Aplique Brumoline y colóquelo en todos aquellos sitios que delaten huellas de los roedores durante 6 noches.
- 2) Si en algún momento queda algún recipiente vacío duplique la cantidad de Brumoline (hay ratas que no comido). Caso contrario solo reponer el consumo.
- 3) Retire las bandejas y espere 5 noches.
- 4) Aplique nuevamente Brumoline durante 6 noches.
- 5) Si nota que desaparece la actividad de los roedores, termine el ciclo de 6 noches y suspenda la aplicación; en caso contrario repita el proceso.

ATENCION.

No debe faltar producto durante el período de combate. El mismo oscila entre 6 y 8 días.

Precauciones

Brumoline es un raticida de acción anticoagulante. CUIDADO PELIGROSA SU INGESTIÓN INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS

Durante su aplicación usar guantes y evitar el contacto con la piel, boca y ojos

No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios.

No aplicar en conductos de aire o fuentes de ventilación que posibiliten la liberación del rodenticida al ambiente.

No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto.

No comer, beber o fumar durante su aplicación

Guardar el producto en su envase original.

No volver a utilizar los envases vacíos.

Aplicar en lugares inaccesibles para los niños y los animales domésticos.

Después de usarlo lavarse bien las manos con agua y jabón.

las mujeres embarazadas no pueden manipular el raticida.

No transportar ni almacenar con alimentos ni medicamentos.

Conservar el lugar desratizado en perfectas condiciones de limpieza.

Se recomienda descartar los roedores muertos, restos de agente tóxico (cebo) y embalaje, envolviendo previamente los mismos usando guantes y bolsas de residuos.

Primeros auxilios

En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua corriente.

En caso de ingestión, no provocar el vómito.

En caso de intoxicación dirigirse al servicio de salud llevando el envase o rótulo del producto y consultar al C.I.A.T. Hospital de Clínicas- 7º piso (tel: 1722)

Advertencia al médico interviniente:

Antídoto: Vitamina K1 por vía oral o endovenosa. En general , aplicar el mismo tratamiento que se emplea en caso de hemorragias por dosis excesivas de dicumarol.

4)- FORMULA

Warfarina.....	0.050 g
Amargante.....	mínimo 0.001g
Cereales, colorantes e inertes.....	c.s.p. 100 g

5)- VIDA UTIL PROPUESTA

Vida Útil: 3 años a partir de la fecha de fabricación.

El producto es estable y mantiene sus propiedades en condiciones normales de almacenamiento.